observation anatomique ~~.....~~ Sur une transposition des viscères dans lhomme.

n°. 140.

en 1786. étant chargé par M.r desault, du Soin de diriger les élèves en chirurgie aux dissections, dans lamphithéâtre de lhôtel dieu, deux dentre eux qui se disposoient a étudier les visceres de la poitrine, furent fort Surpris, en ajant ouvert la cavité, dy trouver le cœur dans une Situation qui ne leur parut pas naturelle. le Sujet ~~....~~ jeunes assez interessant pour en prevenir M.r desault, nous lexaminames avec attention. le cœur que jai lhonneur de presenter à lacadémie est la Seule partie de ce cadavre que jaie pu conserver, il etoit Situé obliquement de gauche à droite son Sommet repondoit au dessous de la mamelle droite, dans lespace compris entre le Sternum et les cartilages de la Sixieme et 7.eme vraie cote du même côté. Sa face plane etoit posée obliquement Sur la partie Superieure et droite du diaphragme. loreillette et le ventricule droit etoit tournés à gauche, le contraire à lieu pour loreillette et le ventricule gauche.

le volume de ce viscere excede un peu letat naturel,
lorigine des gros vaisseaux se fait dans un Sens inverse,
ils Suivent le même ordre dans leur courbure;
le ~~diametre~~ diametre de larteré pulmonaire est plus grand que celui de laorte. larteré carotide gauche Située plus en devant que dans letat naturel passoit devant la trachée artère , lœsophage et laorte pectorale occupoint le côté droit du mediastin posterieur. la veine azigos et le cours

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 25 d 72

torachique le côté gauche le poumon gauche étoit plus volumineux que dans l'état naturel il étoit formé de trois lobes, celui du côté droit plus petit étoit abcédé.
à l'ouverture du bas ventre nous avons trouvé l'estomach situé dans l'hipocondre droit, ayant dans cette région la même disposition que celle qu'il à dans l'état naturel du côté gauche. le foie situé dans l'hipocondre gauche offroit le même phénomène; la rate tenoit au grand cul de sac de l'estomach par les vaisseaux courts mais du côté droit. il y avoit inversion dans la situation du pancréas, des intestins grêles et des gros intestins, le coecum étoit situé dans la fosse illiaque gauche. l's du colon occupoit la droite. le rectum commencoit au coté droit de l'excavation du petit bassin.

nous avons beaucoup d'exemples dans les auteurs, de transposition partielle des viscères, ce que l'on observe plus fréquemment dans la cavité abdominale, et dans le nombre des cadavres que j'ai vûs il s'en est trouvé plusieurs dans ce cas. mais les observations d'inversion générale sont beaucoup plus rares.
Mr morand a fait la dissection d'un soldat invalide mort à l'âge de 72 ans lequel étoit dans ce cas. cette observation anatomique est insérée dans les mémoires de l'académie des sciences année 1699 j'ai cru pouvoir me dispenser de donner des détails sur l'inversion des vaisseaux du bas ventre comme on l'a fait dans l'observation citée.

la situation des viscères l'indiquant assez.

M.r Sue professeur d'anatomie dans ces écoles en a publiée une à peu près semblable, insérée dans les memoires des sçavants étrangers, l'enfant mâle qui en fait le sujet, n'a vecu que cinq jours.

dans le nombre des signes donnés par ce célèbre professeur, pour reconnoître un pareil état dans le sujet vivant, je crois qu'il n'y a d'admissible que les pulsations du coeur, au dessous de la mamelle droite, soit que le sujet soit penché en devant et mieux encore couché sur le ventre, l'usage des purgatifs et des clysteres ne peut donner que des indices tres equivoques.

je pense que l'on pourroit faire plus de cas de la tumefaction du ventre vers l'hipocondre droit, après un grand repas ainsi que du toucher le sujet étant dans une situation convenable.

ce 29 7.bre 1791 Flours

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE